

Tamizaje para sífilis durante control prenatal (mujeres 15-19 y 15-49 años)



TODAS LAS MUJERES
TODOS LOS NIÑOS

POR MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES
SALUDABLES Y EMPODERADOS
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Definición	Porcentaje de mujeres que recibieron una prueba de tamizaje para detección de sífilis como parte de sus cuidados prenatales.																											
Numerador	Número de mujeres que tuvieron acceso a cuidados prenatales y se les realizó una prueba de tamizaje para detección de sífilis.																											
Denominador	Número de mujeres que tuvieron acceso a cuidados prenatales.																											
Unidad de medida	X por ciento (%).																											
Consideraciones para la calidad del indicador	Todas las mujeres deberían ser tamizadas para sífilis en su primera visita prenatal. En caso de que los países reporten datos de tamizaje de sífilis en visitas subsecuentes deben hacer esta aclaración. Se puede reportar el uso tanto de pruebas no-treponémicas de anticuerpos reagínicos (VDRL, RPR), como pruebas treponémicas (TPHA, TPPA, EIA o pruebas rápidas treponémicas).																											
Implicaciones para la interpretación																												
Indicador en contexto	La detección y tratamiento oportunos (suficientemente temprano en la gestación) pueden prevenir efectivamente resultados adversos de la exposición materna a la sífilis, y es la intervención más importante para el control de la sífilis congénita. El tamizaje para sífilis es una de las intervenciones básicas prenatales, por lo que este indicador potencialmente funciona como un trazador de la calidad de los servicios básicos prenatales.																											
Marco de ODS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marco de EWEC-LAC</th> <th>Dimensión</th> <th>Marco de monitoreo</th> <th>Estratificador sugerido para el análisis de desigualdad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sobrevivir ✓</td> <td>Mujer ✓</td> <td>Insumo</td> <td>Sexo</td> </tr> <tr> <td>Prosperar</td> <td>Niñez</td> <td>Salida</td> <td>Etnicidad ✓</td> </tr> <tr> <td>Transformar</td> <td>Adolescencia</td> <td>Resultado</td> <td>Educación ✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Impacto</td> <td>Nivel socioeconómico del hogar o quintiles de riqueza nacional ✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Producto ✓</td> <td>Lugar de residencia (urbano/rural, o ubicación geográfica) ✓</td> </tr> </tbody> </table>				Marco de EWEC-LAC	Dimensión	Marco de monitoreo	Estratificador sugerido para el análisis de desigualdad	Sobrevivir ✓	Mujer ✓	Insumo	Sexo	Prosperar	Niñez	Salida	Etnicidad ✓	Transformar	Adolescencia	Resultado	Educación ✓			Impacto	Nivel socioeconómico del hogar o quintiles de riqueza nacional ✓			Producto ✓	Lugar de residencia (urbano/rural, o ubicación geográfica) ✓
Marco de EWEC-LAC	Dimensión	Marco de monitoreo	Estratificador sugerido para el análisis de desigualdad																									
Sobrevivir ✓	Mujer ✓	Insumo	Sexo																									
Prosperar	Niñez	Salida	Etnicidad ✓																									
Transformar	Adolescencia	Resultado	Educación ✓																									
		Impacto	Nivel socioeconómico del hogar o quintiles de riqueza nacional ✓																									
		Producto ✓	Lugar de residencia (urbano/rural, o ubicación geográfica) ✓																									
N / A																												
Fuente preferida de datos																												
Registros administrativos (reportes de los centros donde se otorga atención prenatal)																												
Fuentes alternativas de datos	Reportes de muestreo o de centros centinelas.																											
Estimaciones por grupos inter agenciales	N/A																											
Marcos de monitoreo global	N/A																											
Para más información	<ul style="list-style-type: none"> • Methods for surveillance and monitoring of congenital syphilis elimination within existing systems. • Prevention of Mother-to-Child-Transmission of Syphilis (Congenital Syphilis): http://www.who.int/reproductivehealth/congenital-syphilis/en/ • Global Health Sector Strategy on Sexually Transmitted Infections 2016–2021. Geneva: WHO; 2016 Available from: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/ghss-stis/en/ • Global guidance on criteria and processes for validation: elimination of mother-to-child transmission of HIV and syphilis, 2nd edition. Geneva: World Health Organization; 2017. Available from: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emtct-hiv-syphilis/en/ • Global Aids Monitoring Indicador 2.4 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-aids-monitoring_en.pdf 																											
Referencias																												